PCSS Medications for Alcohol Use Disorder — Sistema de Apoyo Clínico para Proveedores

¿Debería iniciar un medicamento para ayudar con mi consumo de alcohol?

Opciones de medicación para el trastorno por consumo de alcohol (TCA)

	Naltrexona - oral (ReVia)	Naltrexona - inyección (Vivitrol)	Acamprosato (Campral)	Disulfiram (Antabuse)
Meta de consumo	Abstinencia o reducir consumo	Abstinencia o reducir consumo	Abstinencia o reducir consumo	Sólo abstinencia
Cómo funciona	Disminuye los antojos y efectos placenteros de beber	Disminuye los antojos y efectos placenteros de beber	Disminuye los antojos	Causa una desagradable "resaca instantánea" cuando es combinado con alcohol
Funciona mejor para pacientes que	Prefieren una dosis diaria una única vez	No les gusta tomar pastillas	Tienen grave enfermedad hepática	Se asocian con un amigo o familiar
Dosis	Una pastilla diaria	Una inyección cada 4 semanas	Dos pastillas tomadas 3 veces al día	Una pastilla diaria
Considerar alternativas si	Se toman opioides (p. ej. metadona, buprenorfina)	Se tiene miedo a las agujas o se toman opioides (p. ej. metadona, buprenorfina)	Se tiene dificultad para tomar pastillas múltiples veces al día	La meta no es la abstinencia sino la reducción de la bebida o beber más seguro
Potenciales efectos secundarios	Náuseas, dolor de cabeza	Náuseas, dolor de cabeza, dolor en los glúteos	Diarrea, náuseas	La interacción con el alcohol puede causar dolores de cabeza, enrojecimiento de la cara, pulso rápido, mareos, presión arterial baja y vómitos; inflamación del hígado
Consejos	Tomar con la comida	Rotar sitios de inyección	Tomar con la comida	Tenga cuidado con el alcohol oculto en alimentos, bebidas (p. ej. kombucha, espirituosas sin alcohol), salsas y enjuague bucal

PCSS Medications for Alcohol Use Disorder — Sistema de Apoyo Clinico para Provedores

¿Debería iniciar un medicamento para ayudar con mi consumo de alcohol?

Potenciales preguntas para discutir con su proveedor de atención médica



¿Cuáles son mis metas?
¿Quiero dejar de beber, reducir mi consumo o beber de forma más segura?



¿Funcionan los medicamentos?
¡Sí! Cada uno de estos medicamentos es eficaz para ayudar a lograr sus metas relacionadas con el alcohol.



¿Son seguros?
¡Sí! Estos medicamentos han sido testeados en miles de pacientes y requieren un monitoreo mínimo, si es que hay alguno, por parte de su proveedor de atención médica.



¿Hay efectos secundarios?
La mayoría de los efectos secundarios son leves y suelen desaparecer por sí solos.



¿Cuánto tiempo tendré que tomar los medicamentos?
Tome la medicación mientras funcione, ya sean 6 meses o 6 años. No hay efectos secundarios a largo plazo y no hay síntomas de abstinencia si deja de tomarlos.



¿Son asequibles?
Sí, la mayoría de los seguros cubren medicamentos para el trastorno por uso de alcohol con copagos mínimos. Si no tiene seguro o tiene copagos altos, hable con su proveedor o farmacéutico para obtener ayuda.

Puntos clave finales

- Los medicamentos para controlar el uso de alcohol son eficaces, seguros y económicos.
- Tome el medicamento que mejor le funcione a usted, mientras funcione.
- La medicación es sólo una parte del plan de tratamiento; hable con su proveedor de atención médica sobre otras opciones de tratamiento para combinar con su medicación, como grupos de ayuda mutua con el Recurso de Grupos de Recuperación de PCSS-MAUD.

¡No se dé por vencido! Hay muchas opciones de tratamiento disponibles. Explore los Localizadores de Tratamiento de SAMHSA para obtener más opciones de tratamiento.

Funding Statement

El financiamiento para esta iniciativa fue posible gracias al acuerdo cooperativo No. 1H79TI086771-03 de SAMHSA. Las opiniones expresadas en materiales de conferencias escritos o publicaciones y por oradores y moderadores no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos; tampoco la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implica respaldo por parte del Gobierno de EE.UU.